


Vlerësimi **EQUAL** i Kandidës 2018: Një vlerësim **ECMM** i marrë nga udhëzuesit aktualë për përcaktimin e cilësisë (**QUALITY**) së menaxhimit të Kandidemisë Klinike



Mellinghoff SC^{1,2}, Rutz J², Cornely OA^{1,2} Malaj X^{1,2}

¹ Departamenti I i Mjekësisë Interne, Konfederata Europiane e Mikologjisë Mjekësore (ECMM), Universiteti i Këlnit, Gjermani ² CECAD Klasteri i Ekselencës,

Universiteti i Këlnit, Gjermani
DOI: 10.4126/FRL01-006414592

Në sfond

Vlerësimi EQUAL i Kandidës peshon dhe grumbullon faktorë për një menaxhim ideal të kandidemisë dhe përbën një mjet të rëndësishëm për administrimin antimikotik dhe për verifikimin e përputhshmërisë me udhëzuesit. Pas shqyrtimit të udhëzuesëve aktualë të Shoqatës Europiane për Mikrobiologjinë Klinike dhe Sëmundjet Infektive^{4,5} si dhe të Shoqatës Amerikane të Sëmundjeve Infektive³, është bërë një përzgjedhje e rekomandimeve më të forta të cilat janë integruar në këtë kartë vlerësimi.

Pikët maksimale

Jo-mbartës KVQ-je

Diagnoza **10**

Trajtimi **7**

Ndjekja **2**

Totali 19

Mbartës KVQ-je

Diagnoza **10**

Trajtimi **10**

Ndjekja **2**

Totali 22

Referenca

1. Mellinghoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

Vlerësimi EQUAL i Kandidës ^{1,2}

Diagnoza

Kulturë të gjakut fillestar (40mL) ^{3,4}

3

Identifikim specijeje ^{3,4}

3

Test ndjeshmërie ^{3,4}

2

Ekokardiografi ^{3,5}

1

Oftalmoskopi ^{5,6}

1

Trajtimi

Trajtim me ekinokandinë ^{3,5}

3

Kalo në trajtim me flukonazol në varësi të testit të ndjeshmërisë ^{3,5}

2

Trajtim për 14 ditë pas kulturës së parë negative të ndjekjes

2

Mbartës KVQ-je*: Heqje KVQ-je (*kateteri venoz qendror*) ^{3,5,7}
 ≤ 24 orë ngë vendosja e diagnozës
 > 24 < 72 orë nga vendosja e diagnozës

3

2

* Mbartësit e kateterit marrin pikë shtesë, kështu që pikët totale të tyre ndryshojnë nga ato të jo-mbartësve të kateterit

Ndjekja

Ndjekje me kulturë gjaku (të paktën një në ditë derisa të rezultojë negative) ^{3,5}

2



UNIKLINIK
KÖLN

European Confederation of Medical Mycology



Center of Excellence in Clinical and
Laboratory Mycology and Clinical Studies